

ステロイド+β 刺激薬配合吸入剤

吸入器	フルティフォーム50エアゾール	フルティフォーム125エアゾール		
回数	1日2回			
朝	1回2吸入	1回2吸入	1回3吸入	1回4吸入
晩	1回2吸入	1回2吸入	1回3吸入	1回4吸入
1回量	フルチカゾン:100μ g	フルチカゾン:250μ g	フルチカゾン:375μ g	フルチカゾン:500μ g
	ホルモテロール:10μ g	ホルモテロール:10μ g	ホルモテロール:15μ g	ホルモテロール:20μ g
1日量	フルチカゾン:200μ g	フルチカゾン:500μ g	フルチカゾン:750μ g	フルチカゾン:1000μ g
	ホルモテロール:20μ g	ホルモテロール:20μ g	ホルモテロール:30μ g	ホルモテロール:40μ g

※フルチカゾンプロピオン酸エステル+ホルモテロールフマル酸塩水和物

吸入器	シムビコート			
回数	1日2回			
朝	1回1吸入	1回2吸入	1回3吸入	1回4吸入
晩	1回1吸入	1回2吸入	1回3吸入	1回4吸入
1回量	ブデソニド:160μ g	ブデソニド:320μ g	ブデソニド:480μ g	ブデソニド:640μ g
	ホルモテロール:4.5μ g	ホルモテロール:9μ g	ホルモテロール:13.5μ g	ホルモテロール:18μ g
1日量	ブデソニド:320μ g	ブデソニド:640μ g	ブデソニド:960μ g	ブデソニド:1280μ g
	ホルモテロール:9μ g	ホルモテロール:18μ g	ホルモテロール:27μ g	ホルモテロール:36μ g

※ブデソニド+ホルモテロールフマル酸塩水和物

吸入器	アドエア100ディスカス	アドエア250ディスカス	アドエア500ディスカス	アドエア50エアゾール	アドエア125エアゾール	アドエア250エアゾール
回数	1日2回					
朝	1回1吸入	1回1吸入	1回1吸入	1回2吸入	1回2吸入	1回2吸入
晩	1回1吸入	1回1吸入	1回1吸入	1回2吸入	1回2吸入	1回2吸入
1回量	フルチカゾン:100μ g	フルチカゾン:250μ g	フルチカゾン:500μ g	フルチカゾン:100μ g	フルチカゾン:250μ g	フルチカゾン:500μ g
	サルメテロール:50μ g	サルメテロール:50μ g	サルメテロール:50μ g	サルメテロール:50μ g	サルメテロール:50μ g	サルメテロール:50μ g
1日量	フルチカゾン:200μ g	フルチカゾン:500μ g	フルチカゾン:1000μ g	フルチカゾン:200μ g	フルチカゾン:500μ g	フルチカゾン:1000μ g
	サルメテロール:100μ g	サルメテロール:100μ g	サルメテロール:100μ g	サルメテロール:100μ g	サルメテロール:100μ g	サルメテロール:100μ g

※フルチカゾンプロピオン酸エステル+サルメテロールキシナホ酸塩

吸入器	レルベア100	レルベア200
回数	1日1回	
1日中	1回1吸入	1回1吸入
1回量	フルチカゾンF:100μ g	フルチカゾンF:200μ g
	ビランテロール:40μ g	ビランテロール:40μ g
1日量	フルチカゾンF:100μ g	フルチカゾンF:200μ g
	ビランテロール:40μ g	ビランテロール:40μ g

※フルチカゾンフランカルボン酸エステル+ビランテロールトリフェニル酢酸塩

※ 背景色が同じモノが大体同じ強さ(注:イコールではない)